

Ramik^{MD} BARRES**TOUT-TEMPS**
Tue rats et souris**GARANTIE:**

Diphacinone

.....0,005%

NO. D'HOMOL. 22851

EPA Est. No. 61282-WI-1

LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI**DOMESTIQUE****GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**

MODE D'EMPLOI : Placer des RAMIK BARRES à des endroits où les rats et les souris trouvent et consomment l'appât. Placer l'appât dans des coins, le long des murs, où les rats et les souris se nourrissent.

RESTRICTIONS D'UTILISATION : L'appât DOIT être placé dans un point d'appât protégé ou dans un endroit hors de portée des enfants, des animaux de compagnie et des animaux d'élevage. NE PAS placer l'appât là où il risquerait de contaminer des aliments ou encore sur des surfaces venant en contact direct avec des aliments.

RATS : Placer 8 à 16 RAMIK BARRES d'appât (habituellement à des intervalles de 4,5 à 9 mètres) par placement. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des rats cesse.

SOURIS : Placer 28 à 29 grammes d'appât à un intervalle de 1,5 à 3 mètres par placement. Une plus grande quantité peut être nécessaire là où il y a une activité intense des souris. Renouveler avec des appâts frais sans interruption pendant 15 jours ou jusqu'à ce que l'activité des souris cesse.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, DES ANIMAUX DE COMPAGNIE ET DES ANIMAUX D'ÉLEVAGE. Peut être nocif ou léthal si ingéré ou absorbé par la peau. Porter des gants de caoutchouc lors de la manipulation du produit et de l'élimination des carcasses de rongeurs, des appâts inutilisés et des contenants vides. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Se laver les mains avant de manger, boire, mâcher de la gomme, fumer ou aller aux toilettes. Laver la peau à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé ce produit. Laver les vêtements contaminés séparément, à l'eau chaude et au savon, avant de les porter à nouveau. **TENIR À L'ÉCART DES ALIMENTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE OU ANIMALE.**

PREMIERS SOINS : EN CAS D'INGESTION, donner 1 ou 2 verres d'eau au patient et faire vomir en introduisant un doigt dans le fond de la gorge. Répéter jusqu'à ce que la

vomissure soit claire. Signaler immédiatement à un médecin ou à un centre antipoison tous les cas d'ingestion de ce produit. Prévenir immédiatement un vétérinaire lorsque l'empoisonnement d'un animal de compagnie ou d'élevage est suspecté. Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : Si cette substance est ingérée accidentellement par des humains ou par des animaux familiers, domestiques ou la faune, elle pourrait diminuer la capacité de coagulation du sang et causer une hémorragie. La vitamine K₁, sous forme d'injections intramusculaires ou sous-cutanées ou administrée par la bouche, est suggérée comme traitements curatif pour un empoisonnement par un anticoagulant. La gravité de cas est mesurée en établissant les temps de prothrombine prolongés (T.P.) afin de déterminer la thérapie appropriée. On devra effectuer des traitements répétés si les temps de prothrombine l'exigent.

ENTREPOSAGE : Conserver dans un endroit frais et sec, à l'écart des aliments destinés à la consommation humaine ou animale et des autres produits chimiques. Ranger la portion inutilisée du produit dans son contenant d'origine, dans un endroit sûr à l'abri des enfants et des animaux non ciblés.

ÉLIMINATION : Jeter l'emballage vide dans les ordures ménagères. Si l'appât n'a pas été utilisé le jeter conformément aux exigences locales.

ÉLIMINATION DES RONGEURS : Jeter les rongeurs morts avec les ordures ménagères ou les enterrer.

Medical 1-800-498-5743

☐ 1-800-621-8829

HACCO, Inc.
110 Hopkins Drive
Randolph, WI 53956
1-800-498-5743

Ramik[®] is a Registered Trademark of HACCO, Inc.

Code (NG.NT.) NT.RN.

Item No.: 1257220
Net Contents: 340 g
UPC: 023626 01600 (2)
Format: UPC-A
Label: